

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-7-76261 20

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-ET-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Chemin d'Artigues, 33150 CENON - Tél. 86.22.75 - 86.24.35

**ABONNEMENT ANNUEL
50,00 Francs**

*Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture*

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

23 Juillet 1976 - Bulletin Technique n° 73

MILDIOU DE LA VIGNE

Les orages successifs de la mi-juillet peuvent être à l'origine de contaminations secondaires dans les rares zones où existaient déjà quelques taches. Mais dans l'ensemble du vignoble, ces pluies orageuses ne présentaient pas de danger particulier en l'absence de taches récentes.

Cependant à l'approche de la véraison, nous conseillons d'exécuter un traitement pour maintenir un bon état sanitaire du feuillage en raison de sa sensibilité en fin de saison et assurer un bon aoûtement des bois. Les grappes n'étant plus atteintes après la véraison, ce traitement sera vraisemblablement le dernier, exception faite pour les Pyrénées Atlantiques où la présence de foyers et les cépages plus tardifs pourraient nécessiter une autre intervention. Cette application doit être effectuée de préférence avec un produit contenant du cuivre (spécialités cupriques ou organocupriques) dont l'action est plus prolongée que celle des produits organiques.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

On note la sortie de taches sur feuilles et l'apparition de dégâts sur grappes surtout dans les vignes incultes, mais aussi dans les parcelles situées à proximité. Dans ces situations, il y a lieu de procéder sans délai à un traitement de préférence à base de mancozèbe ou de manèbe à 280 g/MA/hl.

Nous rappelons que les attaques de Black-rot peuvent se produire jusqu'à la récolte, bien qu'à partir de la véraison, on note une diminution de leur importance. Il convient donc de rester vigilant dans les parcelles atteintes.

OIDIUM DE LA VIGNE

Dans les cépages sensibles, nous conseillons d'ajouter un soufre mouillable à la bouillie destinée à combattre le Mildiou et le Black-rot.

.../...

170

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Le deuxième vol est commencé sans un arrêt marqué entre les deux générations. Compte tenu de la précocité de ce vol et des nombreuses captures enregistrées, les attaques risquent d'être importantes, les conditions climatiques restant très favorables aux pontes. Il est donc recommandé d'appliquer dès réception du bulletin un traitement généralisé. Dans les vergers infestés où un traitement a été effectué à la mi-juillet selon les indications particulières du précédent bulletin, il est prudent de renouveler cette pulvérisation après une pluie de plus de 25 mm.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER

Le second vol de papillons se poursuit et il est nécessaire de maintenir la protection selon les conseils du bulletin n° 72 en respectant les délais d'application avant récolte. La protection devra être étendue aux variétés arrivant à maturité fin août.

CARPOCAPSE DES NOIX ET BACTERIOSE

Appliquer dans les prochains jours un traitement insecticide avec une des spécialités conseillées dans le bulletin 71 du 2 juillet.

Adjoindre à l'insecticide un produit cuprique à 150 g de cuivre métal/hl destiné à la protection contre la bactériose.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie et
l'Ingénieur des Travaux Agricoles
chargés des Avertissements Agricoles
J. TOUZEAU P. TISSE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE"
M. LARGE

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : P. JOURNET
Inscription à la C.P.P.P. n° 524 AD